

Non-Staining BIOACTIVE Bioceramic



AVALON BIOMED

Advanced Bioceramics

ENDODONTIC SEALER

NeoSEALER™ Flo

CLINICAL DIRECTIONS FOR USE:

- Excavate carious tooth structure using a round bur in a handpiece at low speed or use hand instruments.
- Debride, clean, shape and disinfect the root canal system using intra-canal instruments under rubber dam isolation.
- After preparation and irrigation of the root canal, including removal of smear layer, dry the canal using paper points to remove pooled irrigants or body fluids. Moisture is required for setting.
- NeoSEALER Flo may be used with or without the Flo Tip, but the Flo Tip is recommended.

USE WITHOUT the Tip:

- For obturation techniques where most of the canal is obturated by gutta percha points, first apply a light coating of NeoSEALER Flo material to the canal walls using a device of your choice.
- Second, coat the disinfected and dried gutta percha points with NeoSEALER Flo material before insertion.

USING the Tip:

- Attach the Flo Tip to the NeoSEALER Flo syringe.
- Insert the Flo Tip into the canal to the desired depth, taking care to not insert the end past the middle third of the root canal.
- DO NOT force the Flo Tip into the canal such that it seals against the canal walls. Doing so may force the sealer to be expressed beyond the apex.
- Apply gentle, steady pressure to the syringe plunger with a constant outward movement from the canal as the material is injected.
- If using a higher gauge (smaller diameter) dispensing tip, pump the syringe until NeoSEALER Flo is seen dispensing. Apply constant pressure to continue with the dispensing.

NOTE: NeoSEALER Flo may be difficult to dispense using higher gauge (smaller diameter) tips.

- Slowly, insert a single or multiple cones into the canal.
- Melt and cut off excess gutta percha at the orifice following the manufacturer's directions.

- Remove excess sealer with a moist cotton pellet.
- Confirm placement of the material in the complete root canal system and check for any over-extrusion with a radiograph.

OTHER APPLICATIONS:

NeoSEALER Flo may be used with NeoPUTTY™ for obturation of primary teeth with no successor, or otherwise unsalvageable teeth.

NOTE: For removal of root canal filling, use conventional instrumentation to remove set sealer, including hand/rotary files and ultrasonic instrument tips, as with any other sealer.

ADA 57, ISO 6876 & ISO 9917-1 Criteria

- Working Time at room temperature: >40 min.
- Initial Setting Time at 37°C, in vivo (or moist environment): 11 hrs ± 1 hr.
- Flow: >17 mm.
- Film thickness: <50 µm.
- Solubility: <3%.
- Dimensional stability: <1% shrinkage & <0.1% expansion.
- Radiopacity: 6 mm equivalent of aluminum.
- Pb and As: <2 ppm.

See: www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines-H.pdf

- Setting of tricalcium silicates is inhibited in acidic environments such as infected sites.

SYMBOLS USED ON LABELING:

IFU-57 Rev 4 Avalon Biomed NeoSEALER Flo (Multi Lang)

	Manufacturer	Caution	Expiration Date
	Authorized Representative in the European Community		
	Prescription Only		
	Consult Instructions For Use		
			Mfg. by NuSmile, Ltd 3315 West 12th St Houston, TX 77008 USA +1.713.861.0033
			KinderDent GmbH Gutenbergstraße 7 Weyhe, D-28844 Germany

EC

REP

EC

REP

DUTCH NEDERLANDS

NeSEALER™ Flo
SAMENSTELLING EN BESCHRIJVING
Biologische pasta bestaande uit een ontzettend fijn, anorganische polver van trikalium/dikalsiumzilikaat in een organisch medium. Het product is gebruiksaanbevolkt. Mocht de pasta niet zijn nodig, NeSEALER Flo is onvoldoende om te houden in aanwezigheid van vocht en moet de ontleding worden voorkomen.

MATERIALEIGENSCHAPPEN

- Bioceramische bioactiva
- Verkeert de tanden niet
- Radiopaca
- Zonder hars
- INDICATIES**
 - Obturatie en afsluiting van wortelkanalen.
 - CONTRA-INDICATIES
 - Overgevoeligheid voor bijtende oplossingen (met hoge pH-waarde).
 - Niet gebruiken voor pulpectomie van de primaire tand (wortelkanaalvulling) tenzij de permanente ovolgert tand ontbrekt.
- ONGEWENSTE BIJWERKINGEN**
Omkeerbare acute ontsteking van het mondlijmvlies bij contact met ongehande pasta.
- WAARSCHUWINGEN**
NeSEALER Flo is bijtend, net als alle andere tinctuurindicaties.
- INTERACTIES MET ANDERE TANDHEKELIJNDIGE MATERIALEN**
Onbekend.
- BEWAARDING**
Bewaar en gebruik bij ± 72° F (22° C) voor een optimale effect garantie (niet gekoeld bewaren). Na elke gebruik het product goed sluiten, om verharding te voorkomen.

FRANCAISE (FRENCH)

NeSEALER™ Flo
COMPOSITION & DESCRIPTION
Pasta biologique contenant du calcium inorganique extrêmement fin de silicate trikalium/dikalzium et un milieu organique. Le produit est préférable à l'amiante. Aucun mélange n'est nécessaire. NeoSEALER Flo est conçu pour se fixer in vivo en présence de l'humidité fournie par les tissus environnants.

CARACTÉRISTIQUES DES MÉTÉRIAUX

- Biocéramique bioactive
- Ne décole pas les dents
- Radiopaque
- Sans résine
- RECOMMANDATIONS**
 - Obturation et scellement des canaux radiculaires.
 - CONTRA-INDICATIONS
 - Hypersensibilité aux solutions caustiques (pH élevé).
 - Ne pas utiliser pour la pulpectomie de la dent primaire (obturation du canal radiculaire), sauf si la dent successeuse permanente est absente.
 - EFFETTS INDÉSIRABLES
Inflammation aiguë reversible de la muqueuse buccale en cas de contact avec la peau non durcie.
 - ARTÉRIEMENTS**
NeoSEALER Flo est caustique, comme tous les siliques tricalciques.
 - INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MATERIAUX DENTAIRES**
Aucune connue.
 - CONSERVATION**
Conserver et utiliser à ± 72° F (22° C) pour une manipulation optimale (pas réfrigérer). Pour éviter le durcissement du NeoSEALER Flo, fermez immédiatement après chaque utilisation. Conservez la

DEUTSCH (GERMAN)

NeSEALER™ Flo
ZUSAMMENSETZUNG & BESCHREIBUNG
Biologische Pasta bestehend aus einem extrem feinen, anorganischen Pulver von Trikalium/Dikalziumzilikaat in einem organischen Medium. Das Produkt ist gebräuchserfordert. Wenn das Pulpa nicht benötigt wird, kann die Verarbeitung aufgrund der Feuchtigkeit aus dem Mundraum verhindert werden.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Biokeramische Flüssigkeit wurde entwickelt, wie bei allen Wurzelkanalmaterialien, nach dem Stand der Technik, eine spezielle chirurgische Entfernung des Materials in Beziehung gezozen werden.
- MINIMIZEREN Sie die Übertragung des Materials über die Spitze hinweg.
- VERMEIDEN Kontakt mit ungeseztem NeoSEALER Flo mit der Haut oder Mundschleimhaut. Nach zufälligem Kontakt mit dem Material mit Wasser abwaschen und abspülen.
- TRAGEN Sie geeignete Handschuhe und eine Schutzhülle während des Gebrauchs.
- NeoSEALER Flo MUSS GUT VERSCHLOSSEN AUFBEWAHRUNG WERDEN. Es muss nach jedem Gebrauch sofort wieder verschlossen werden.
- SUM SCHUTZ gegen das Eindringen von Feuchtigkeit sollte NeoSEALER Flo in seinem schützenden Aluminiumpackung gelagert werden.
- VERWENDEN Sie die entsprechenden Desinfektionsmittel um die Spülung und die Desinfektion der NeoSEALER Flo einzusetzen.
- Utilisieren Sie immer einen neuen Flo Tip, um die Spülung und die Desinfektion der NeoSEALER Flo zu gewährleisten.
- EVITEZ de mettre la seringue en contact avec une surface contaminée.
- COUVREZ le corps de la seringue avec un manchon protecteur si vous utilisez par voie intraoperative, pour minimiser la contamination de la seringue.
- PROTEUR contre l'intrusion d'humidité, conservez NeoSEALER Flo dans son récipient protecteur en aluminium.
- Utilisez TOUJOURS un nouvel embout Flo lorsque vous appliquez le NeoSEALER Flo.
- EVITEZ de mettre la seringue en contact avec une surface contaminée.
- COUVREZ le corps de la seringue avec un manchon protecteur jeûne si vous utilisez par voie intraoperative, pour minimiser la contamination de la seringue.
- NeoSEALER Flo et les embouts Flo sont fournis dans un emballage propre et stérile. Ces produits ne peuvent pas être stérilisés. Les cliniciens doivent suivre leurs protocoles établis pour le nettoyage et la désinfection de la seringue NeoSEALER Flo entre chaque utilisation.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE FORCEZ PAS le Flo Tip dans le canal de manière à ce qu'il s'applique contre les parois du canal. Cela pourrait forcer l'expansion de l'agent d'obturation au-delà de l'apex.
- Pour les techniques d'obturation où la plus grande partie du canal est obturée par des points de goutte perçue, appliquez d'abord une légère couche de NeoSEALER Flo sur les parois du canal à l'aide d'un appareil de votre choix.
- Enduissez ensuite les pointes de goutte perçue jusqu'à l'enfoncement dans le système canalaire complet et vérifiez l'absence de suréxposition à l'aide d'une radiographie.
- Fixez le Flo Tip à la seringue NeoSEALER Flo.
- INSÉREZ le Flo Tip dans le canal à la profondeur désirée, en prenant soin de ne pas insérer l'extrémité au-delà du tiers central du canal radiculaire.
- NE